





Des fourrages de qualité pour des rations performantes et économiques

Faire analyser ses fourrages



La date de récolte : facteur clé de qualité des fourrages



Valeurs alimentaires ensilage et enrubannage en fonction de la date de récolte (Extrait base de données Agrinir Indre-Cher-2023)

- ✓ Retarder la récolte = diminution de 1 point de protéine par semaine
- ✓ Des graminées à plus de 15% de protéines, c'est possible !
- ✓ Les légumineuses = la valeur sûre pour produire de la protéine.




Des rations sans correcteur azoté

Essais réalisés à la Ferme Expérimentale des Bordes



Ration vache de réforme
(kg MS/vache/jour)



Engraissement de vaches de réforme Charolaises.

- GMQ moyen : 1050 g/j
- Poids carcasses : 440 kg, R+3

	Ingestion (kg MS/VR/j)	MS (%)	MAT (g/kg MS)	UFV (/kgMS)	PDIN (g/kgMS)	PDIE (g/kgMS)
Luzerne enrub.	8.4	69	167	0.66	107	86
Paille de blé	2.7	89	30	0.36	17	45
Blé aplati	5	92	121	1.18	81	102
TOTAL	16.1	79	130	12.58	1398	1410

Densité énergétique 0.77 UFV/kg MS - Densité protéique : 111 g PDI/UFV

