# Fiche descriptive Interculture courte - 2018
## AAC de Dammarie

## Objectifs du couvert

- Système en semis direct.
- Maintien d'un couvert en interculture avec destruction au semis de l'orge pour maximiser l'effet du couvert sur le sol et limiter les levées d'adventices.

## Données mesurées







Date : 16/07/2017
Composition :
- Repousses de colza
Commentaires : un déchaumage précoce avec roulage pour favoriser le développement des repousses.

13/10 : Semis de l'orge
16/10 : Destruction chimique en pré-levée de l'orge

**89** *Reliquat (en KgN/ha)* **36** *Rendement culture précédente (en qtx)*

**69** *Quantité d'azote absorbé au 18/09/18 (en KgN/ha)*

## Résultats

### Biomasses par espèce




### Reliquats







## Observations

Repousses développées grâce à la récolte précoce du colza, au déchaumage avec roulage et à la destruction tardive. Un reliquat entrée hiver moyen obtenu grâce aux grosses repousses, et cela malgré les fortes quantités d'azote dans le sol en post-récolte. Une décomposition précoce des repousses est à l'origine de fortes quantités d'azote ammoniacal dans le premier horizon. La pesée faîte mi-septembre est précoce par rapport à la date de destruction mais a été réalisée au moment où les repousses étaient les plus développées.