

Etat de la plaine actuellement

Forte hétérogénéité dans le développement des colzas entre parcelles : de semis jusqu'à colza à 6-7 feuilles

Lutter contre les repousses de céréales, les RGA et les vulpins

Les repousses de céréales n'ont pas toutes levées cet été ; elles peuvent, par leur rapidité de développement et leurs grosses biomasses, concurrencer fortement les colzas notamment sous les andains de moissonneuses :

- Les traiter tôt, dès 1-2 feuilles des repousses si possible par fortes hygrométries (après les pluies ou le matin) avec un volume d'eau important ;
- Utiliser un produit à base de FOP pour la rapidité d'action (action a minima en 8/10 jours) avec une dose adaptée au stade des repousses.

Compte tenu de leurs nombres, les graminées adventices concurrenceront également les colzas. Malgré les résistances présentes, il subsiste une possibilité de diminuer les populations en attaquant rapidement dès 2-3 feuilles des graminées :

- Les traiter, dès 2-3 feuilles par fortes hygrométries (après les pluies ou le matin) avec un volume d'eau important (au moins de 150 l/ha) ;
- Utiliser un produit à base de DIME pour l'efficacité avec une dose adaptée au stade des graminées.



Lutte contre les petites altises



Moins de 25 %
de la surface touchée



Plus de 25 %
de la surface touchée

Les parcelles sont sensibles dès la levée jusqu'à 2-3 feuilles par prédation sur cotylédons ou jeunes feuilles.

- Surveiller, en priorité, les bordures de parcelles car les attaques commencent toujours à partir des repousses de l'année d'avant ; l'activité des petites altises est diurne et le traitement doit être effectué en journée.
- Les pyrèthres sont efficaces, aucune résistance est détectée. Le volume d'eau doit être important (au moins de 150 l/ha) car la surface foliaire est faible ; ne traiter que les 24 à 48 mètres envahis peut suffire.



Point de vigilance : Lutte contre les limaces

Les situations de non-labours motteuses ou avec beaucoup de pailles sont des situations les plus critiques. En situation irriguée, les limaces sont également en situations très favorables.

Dans tous les cas, elles peuvent remonter vers la surface et dévorer les plantules. A surveiller avant et à la levée par piégeage.